


ESCABIOSE



1. Lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos em regiões interdigitais, punhos, axilas, região periumbilical, interglúteo e órgãos genitais, com presença de prurido intenso, principalmente no período noturno.

2. Orientar sobre transmissibilidade, higiene pessoal, higiene com roupas pessoais e de cama com água quente; prevenção na família, investigar e tratar outros casos no núcleo familiar e escolar; manter as unhas curtas.

Ivermectina, dose única, VO, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24 kg – ½ comprimido; 25 a 35 kg – 1 comprimido; 36 a 50 kg - 1 e ½ comprimidos; . 51 a 65 kg - 2 comprimidos; 66 a 79 kg - 2 e ½ comprimidos; 80 kg ou mais 3 comprimidos ou 200mg/kg.), a dose pode ser repetida após uma semana. Os comprimidos de ivermectina devem ser ingeridos com água. Em geral, uma dose única do medicamento é suficiente para a eliminação de vermes e parasitas. A necessidade, ou não, de repetir o tratamento dependerá de avaliação médica e/ou realização de testes laboratoriais. http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12869882017&pIdAnexo=7703436
Permetrina a 5% em creme, uma aplicação a noite, por 6 noites. Se a criança for menor de 6 anos de idade, diluir em 200ml de água e aplicar após o banho, deixar agir e lavar após 1 hora. Isolar a criança da escola até 24h após o término do tratamento.