


## PEDICULOSE



1. Inspeccionar a cabeça diariamente á procura de piolhos e lêndeas e passar assiduamente o pente fino para retirada de piolhos. As lêndeas devem ser retiradas um a uma, já que os medicamentos muitas vezes não eliminam os ovos. Para facilitar a retirada das lêndeas, pode ser usada uma mistura de vinagre e água em partes iguais, embebendo os cabelos por meia hora antes de proceder a retirada. Não se deve compartilhar objetos pessoais tais como: travesseiro, pente, boné, lenço de cabeça, presilha, etc; manter cabelos curtos e presos. A escola deve ser comunicada para que outros pais verifiquem a cabeça de seus filhos, interrompendo assim o ciclo de recontaminação; manter as unhas limpas e curtas para evitar lesões e contaminação no couro cabeludo.

2. Permetrina 1% loção. Aplicar sobre os cabelos limpos e molhados, deixar agir por 10 min e enxaguar com água corrente. Em geral uma única aplicação é suficiente. Se ainda houver piolhos e lêndeas após 7 dias da primeira aplicação, aplicar o medicamento pela segunda vez. Após 7 dias da segunda aplicação caso o paciente ainda encontre algum piolho vivo, deverá procurar o médico. Não deve ser usada nas crianças menores de 02 anos. Advertências e Precauções: O paciente deve testar este medicamento em uma pequena área do couro cabeludo para saber se tem hipersensibilidade. Se o paciente apresentar coceira ou vermelhidão ou irritação no couro cabeludo, na área de teste, o produto não deverá ser aplicado. Se o paciente apresentar alguma irritação e não houver melhora com a suspensão do uso do produto, ele deverá procurar o médico. Permetrina não é irritante ocular, mas o contato deve ser evitado, pois os outros componentes podem ser muito irritantes. Em caso de contato acidental com os olhos o paciente deve lavar abundantemente com água. Em caso de ingestão acidental do produto o paciente deve procurar orientação médica imediatamente. Este medicamento não deve ser aplicado se tiver alguma inflamação, ferimento, queimadura ou outros tipos de lesões no couro cabeludo. O paciente não deve usar secador de cabelo enquanto estiver usando este medicamento, não há dados evidenciando se esse uso poderia afetar a eficácia da permetrina no tratamento. O paciente deve usar este medicamento apenas na presença de piolhos vivos ou lêndeas, não podendo ser usado para prevenção. Mulheres grávidas ou amamentando não devem usar este medicamento sem orientação médica.[http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila\\_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5022362014&pIdAnexo=2096200](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5022362014&pIdAnexo=2096200)

3. Ivermectina, dose única, VO, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24 kg - ½ comprimido; 25 a 35 kg - 1 comprimido; 36 a 50 kg - 1 e ½ comprimidos; . 51 a 65 kg - 2 comprimidos; 66 a 79 kg - 2 e ½ comprimidos; 80 kg ou mais 3 comprimidos ou 200mg/kg.), a dose pode ser repetida após uma semana. Os comprimidos de ivermectina devem ser ingeridos com água. Em geral, uma dose única do medicamento é suficiente para a eliminação de vermes e parasitas. A necessidade, ou não, de repetir o tratamento dependerá de avaliação médica e/ou realização de testes laboratoriais.[http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila\\_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12869882017&pIdAnexo=7703436](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12869882017&pIdAnexo=7703436)