




	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
Versão 01 Pág 1/4	REGRAS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA	POP/SAMU 06	
OBJETIVO: Reduzir risco de exposição ocupacional a materiais biológicos, substâncias químicas e riscos físicos.			
RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Condutor/socorrista.			
Nº	Ação	Atribuição	Informações complementares
01.	Utilizar o uniforme padronizado durante o turno de trabalho	Equipe	A utilização do uniforme completo é obrigatória. Utilizar o uniforme padronizado do SAMU todo fechado até o pescoço, com mangas longas, coturno ou sapato fechado de material impermeável; Motolâncias: conforme padronização POP 10 (Regras gerais e atribuições específicas para condutores da motolância).
02.	Higienizar as mãos	Equipe	Realizar a higienização das mãos antes e após cada atendimento. Caso haja dificuldade, utilizar solução alcoólica entre um atendimento/paciente e outro; Quando houver sujidade visível a lavagem das mãos é imprescindível antes da utilização de solução alcoólica.
03.	Utilizar dispositivos de barreira	Equipe	Utilizar em todas as ocorrências: luvas de procedimento, máscara facial e óculos protetores. Utilizar outros dispositivos (Máscara N95, Avental Descartável, Touca descartável) quando necessário conforme Anexo I.
04.	Utilizar EPI para limpeza e desinfecção da viatura, artigos e superfícies	Equipe	Verificar IT-05 (Limpeza concorrente da viatura), IT-06 (Limpeza Terminal da viatura) e IT-09 (Limpeza e Desinfecção de artigos).
05.	Utilizar Cinto de segurança / Capacete	Equipe	Efetuar todos os deslocamentos dentro da viatura com o uso de cinto de segurança; Motolâncias: uso de capacete obrigatório.
06.	Manter circulação de ar natural na viatura	Equipe	Manter janelas abertas para ventilação natural durante o transporte de pacientes com suspeita de tuberculose, meningites, influenza, sarampo, varicela, herpes Zoster e SARG. Após o transporte de pacientes nas condições citadas, realizar a limpeza concorrente conforme IT 05.
07.	Descartar Pêrfuro-cortantes	Equipe	Descartar os materiais pêrfuro-cortantes em local apropriado. O coletor deve ser descartado quando seu conteúdo alcançar 2/3 de sua capacidade. Reencepe de agulhas ou demais pêrfuro-cortantes é contra-indicado.
Preparado por: Enfermeiros SAMU DEZ/2010		Revisado por: Colegiado e Supervisão SAMU JUN/2018	Aprovado por: Serviço de Enfermagem _____/____/____

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
Versão 01 Pág 2/4	REGRAS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA	POP/SAMU 06

ANEXO

Equipamento de proteção Individual – EPI	Tipo de contato	Tempo de utilização
Luvas de procedimento de látex	Quando houver possibilidade de contato com sangue e fluidos corpóreos, mucosas e pele não íntegra, para manuseio de itens ou superfícies sujas com sangue e fluidos, para punção venosa e ou outros acessos vasculares.	Trocar após o contato com cada paciente e quando danificada.
Máscara N95	Para todo atendimento a pacientes com suspeita de tuberculose, meningites, influenza, sarampo, varicela, herpes Zoster e SARG (síndrome aguda respiratória grave).	Pode ser utilizada por até 30 dias, desde que não apresente umidade, sujidade ou dano na integridade.
Máscara descartável	Profissionais: Para atendimento a pacientes sintomáticos respiratórios, tosse persistente e durante procedimentos com a possibilidade de envolver respingos de sangue ou fluido corporal como aspiração de via aérea, intubação traqueal, trauma de face etc. Paciente: Todos os pacientes com suspeita de tuberculose, meningite, influenza, sarampo, varicela, herpes Zoster e SARG, deverão utilizar máscara descartável desde a saída da unidade de saúde de origem até a unidade de saúde de destino, inclusive dentro da ambulância durante o transporte.	Trocar quando úmida ou suja.
Óculos Protetores	Em procedimentos que apresente risco de gerar respingos de sangue e fluidos que possam atingir porções superiores e laterais dos olhos. Risco de ferimento nos olhos através do impacto de partícula	Trocar se apresentar riscos ou opacidade. Evitar quedas, guardar na embalagem original. Limpar diariamente ambos os lados com flanela limpa ou papel absorvente. Se apresentar material biológico limpar com água e sabão e friccionar álcool 70% deixar secar naturalmente.
Avental descartável e touca	Utilizar em todos os casos em que há indicação de precaução de contato.	A cada paciente, quando for danificado, sujo ou molhado.
Coturno	Proteção contra quedas, choque elétricos, respingos, umidade e contato direto da pele com material biológico ou agente químicos.	Trocar quando este apresentar-se danificado
Macacão	Proteção de membros superiores, inferiores e tronco contra material biológico contaminado; Proteção mecânica contra lesões externa; Proteção contra acidentes principalmente no período noturno	Trocar quando este apresentar-se danificado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
Versão 01 Pág 3/4	REGRAS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA	POP/SAMU 06

**ANEXO II
DE PRECAUÇÕES DE BIOSSEGURANÇA CONFORME ANVISA**

Precaução Padrão

Devem ser seguidas para **TODOS OS PACIENTES**, independente da suspeita ou não de infecções.



Higienização das mãos



Luas e Avental



Óculos e Máscara



Caixa pérfuro-cortante

- **Higienização das mãos:** lave com água e sabonete ou fricção as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções.
- Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.
- Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.

Precaução de Contato



Higienização das mãos



Avental





Luvas



Quarto privativo

- **Indicações:** infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
- Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
Versão 01 Pág 4/4	REGRAS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA	POP/SAMU 06

ANEXO II
DE PRECAUÇÕES DE BIOSSEGURANÇA CONFORME ANVISA

Precauções para Aerossóis



Higienização das mãos



Máscara PFF2 (N-95)
(profissional)



Máscara Cirúrgica
(paciente durante o transporte)



Quarto privativo

- **Precaução padrão:** higienize as mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, descarte adequadamente os perfuro-cortantes.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo microrganismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.
- Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara antes de entrar no quarto.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.

Precauções para Gotículas



Higienização das mãos



Máscara Cirúrgica
(profissional)



Máscara Cirúrgica
(paciente durante o transporte)



Quarto privativo

- **Indicações:** meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc.
- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.
- O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.